Coordinamento Commissione Salute

c/o REGIONE PIEMONTE

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2019 – G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 12-11-2019

(D.Lgs. 17-8-1999 n. 368; D.Lgs. 8-7-2003 n. 277; D.M. 7.3.2006)

ISTRUZIONI GENERALI

Il presente plico, **da aprire solo all'ordine del Presidente della Commissione pena l'annullamento della prova**, racchiude:

- un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato;
- un modulo su cui riportare le risposte alle domande formulate;
  (i due moduli sono su un unico foglio diviso da una linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione)
- il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate: **ciascuna domanda prevede una sola risposta esatta.**

Il **modulo delle risposte** è stampato in modo da riportare la risposta a ciascuna delle 100 domande del questionario secondo la progressione numerica di queste ultime: per ciascuna domanda sono previste cinque caselle incolonnate sotto le lettere a, b, c, d, e.

Il candidato, **per indicare la risposta ai quesiti formulati**, dovrà:

1. individuare sul modulo delle risposte il numero corrispondente alla domanda del questionario;

2. annerire, **solo ed esclusivamente** con un tratto orizzontale uniforme e ben marcato, la casella corrispondente alla risposta che si ritiene esatta.

Ciascuna domanda prevede una sola risposta esatta

E' obbligatorio dare risposta a tutte le domande

La mancata risposta si considera risposta errata

Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate

Non sono ammesse cancellazioni né correzioni

550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 22201902

1. **Le infezioni delle vie urinarie sono per la maggior parte causate da:**

   a. Stafilococco
   b. E.Coli
   c. Streptococco
   d. Clamidia
   e. Ureaplasma

2. **A quale genere appartiene l'agente eziologico della tubercolosi?**

   a. Borrelia
   b. Bordetella
   c. Bacillus
   d. Mycobacterium
   e. Corynebacterium

3. **Quale indagine permette, meglio di tutte le altre, la visualizzazione dei dotti pancreatici?**

   a. Ecografia addome
   b. TAC addome
   c. RMN addome
   d. Eco-endoscopia pancreatica
   e. ERCP (colangio-pancreatografia endoscopica retrograda)

4. **A quale gruppo sierologico appartengono gli Streptococchi responsabili di meningiti neonatali?**

   a. Gruppo A
   b. Gruppo B
   c. Gruppo C
   d. Gruppo D
   e. Gruppo E

5. **Al fenomeno "LE" (cellule specifiche riscontrate nel lupus eritematoso sistemico) partecipano:**

   a. I basofili
   b. I linfociti T
   c. I linfociti B
   d. I neutrofili
   e. Le piastrine

6. **Che tipo d'inclusioni si formano nelle cellule infettate con il virus dell'herpes simplex?**

   a. Corpi del Negri
   b. Granuli di Babes Ernst
   c. Granuli di Much
   d. Corpi di Lipschutz
   e. Corpi di Guarnieri

7. **Quale tra le seguenti condizioni non è tra le cause di alcalosi metabolica?**

   a. Vomito persistente
   b. Terapia protratta con antiacidi
   c. Ipersecrezione di mineralcorticodi
   d. Uso di diuretici dell'ansa o di diuretici tiazidici
   e. Insufficienza renale acuta in fase oligurica

8. **La deposizione di rame nel SNC nel Morbo di Wilson interessa:**

   a. Il talamo
   b. L'amigdala
   c. Il chiasma ottico
   d. I nuclei della base
   e. La capsula interna

9. Cosa rappresenta la capacità polmonare totale (TLC)?

a. Il volume di gas contenuto nei polmoni dopo un'espirazione massimale
b. Il volume di gas contenuto nei polmoni dopo un'inspirazione massimale
c. Il volume di gas contenuto nei polmoni misurato a riposo
d. Il volume di gas contenuto nei polmoni, misurato dopo sforzo fisico
e. Il volume di gas contenuto nei polmoni in un paziente con enfisema dopo espirazione

10. Feci ad acqua di riso sono caratteristiche di:

a. Colite ulcerosa
b. Colera
c. Morbo di Crohn
d. Sprue
e. Appendicite acuta

11. Giovane studente lamenta da alcune ore iperpiressia, cefalea ingravescente, vomito, confusione e presenta aspetto notevolmente sofferente. Il giorno precedente ha accusato intensa otalgia e febbre trattata con paracetamolo e terapia locale (antibiotico+cortisone) senza beneficio. Il possibile sospetto diagnostico è:

a. Otomicosi
b. Pansinusite
c. Sindrome influenzale
d. Meningite
e. Ascesso dentario

12. Gli immunocomplessi antigene-anticorpo si depositano più facilmente:

a. Nella mucosa gastrica
b. Nella vescica
c. Nei linfonodi
d. Nel glomerulo renale
e. Nella milza

13. Quale dei seguenti non rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di diabete mellito di tipo 2?

a. Obesità
b. Malattia autoimmunitaria
c. Ipertensione arteriosa
d. Sindrome metabolica
e. Sedentarietà

14. I sulfamidici sono:

a. Antibiotici
b. Chemioterapici
c. Composti di origine animale
d. Composti di origine vegetale
e. Composti estratti dal terreno

15. Il CA 15.3 è un marker tumorale utilizzato per:

a. Lo screening del cancro del colon
b. Lo screening del cancro della mammella
c. Lo screening del cancro della prostata
d. Il monitoraggio post operatorio del cancro della mammella
e. Il monitoraggio post operatorio del cancro della tiroide

16. Quale tra i seguenti antibiotici è il più indicato per la profilassi della peritonite batterica spontanea nel paziente con cirrosi ed ascite?

a. Neomicina
b. Paramomicina
c. Co-trimossazolo
d. Norfloxacina
e. Vancomicina

17. Quale tra le seguenti caratteristiche non è propria del dolore da ischemia miocardica?

a. È in genere graduale all'inizio
b. È generalmente provocato dall'esercizio fisico
c. Cambia con la respirazione o la posizione
d. Può rispondere alla nitroglicerina
e. Si irradia spesso ad altre parti del corpo

18. Il sovraslivellamento del tratto ST-T nelle derivazioni D_2, D_3, aVF consente di porre diagnosi di infarto miocardico in sede:

a. Inferiore
b. Laterale
c. Anteriore
d. Antero-laterale
e. Settale

19. Tutte le seguenti sono causa di ginecomastia tranne una. Quale?

a. Uso di antialdosteronici
b. Cirrosi epatica
c. Sindrome di Turner
d. Carcinoma testicolare
e. Tumore delle cellule di Leydig del testicolo

20. Con il termine nefropatia da analgesici si identifica:

a. Una nefropatia caratterizzata da necrosi papillare e/o nefrite cronica interstiziale
b. Una glomerulonefrite cronica membranosa
c. Una sindrome nefrosica
d. Una glomerulonefrite cronica membrano-proliferativa
e. Una calcolosi renale bilaterale

21. In quale delle sotto indicate condizioni si rileva polso celere?

a. Ipovolemia
b. Infarto del miocardio
c. Shock
d. Pericardite costrittiva
e. Tireotossicosi

22. In quale di queste condizioni si ha il segno di Romberg positivo ad occhi sia chiusi sia aperti?

a. Adiadococinesia
b. Strabismo
c. Atassia cerebellare
d. Atassia tabetica
e. Polineurite

23. In relazione ai farmaci antidiabetici orali SGLT2-inibitors (Sodio-Glucosio-CO-Transporter 2 inibitori), quale affermazione non è corretta?

a. Agiscono riducendo il riassorbimento di glucosio a livello del tubulo contorto prossimale
b. La riduzione della glicemia è indipendente dalla secrezione di insulina
c. I maggiori effetti collaterali sono rappresentati dalle infezioni urogenitali
d. Inducono calo ponderale
e. Possono essere utilizzati in associazione con metformina ma non con insulina

24. Tutte le sotto indicate condizioni possono complicarsi con un diabete di tipo 2 ad esclusione di una. Quale?

a. Morbo di Simmonds
b. Emocromatosi
c. Acromegalia
d. Morbo di Cushing
e. Feocromocitoma cronico

25. In un paziente che lamenta dolore all'ipocondrio destro, nausea e febbre fino a 38° C e che presenta in anamnesi calcolosi della colecisti, quale tra i seguenti esami è più opportuno eseguire in prima istanza?

a. Rx diretta addome
b. Esofagogastroduodenoscopia
c. Ecografia addome
d. TAC addome
e. RMN addome

26. La diagnosi di blocco atrio-ventricolare di primo grado si pone quando l'intervallo PR è maggiore o uguale a:

a. 160 msec
b. 180 msec
c. 200 msec
d. 220 msec
e. 240 msec

27. Non è causa di ostruzione delle vie aeree in soggetti asmatici:

a. La pollinosi
b. La virosi respiratoria
c. L'esposizione all'aria fredda
d. Il solfato di magnesio
e. L'esercizio fisico

28. Qual è il più importante stimolatore della secrezione acida gastrica?

a. Colecistochinina
b. Gastrina
c. Somatostatina
d. Istamina
e. Acetilcolina

29. L'amiloidosi renale è una complicanza frequente nei pazienti che effettuano sedute dialitiche da molti anni. Quale forma di amiloidosi è caratteristica in questi pazienti?

a. AA
b. ß2 microglobulina
c. AL
d. ATTR
e. AMed

30. Quale tra le seguenti caratteristiche non compete al quadro di Acute Kidney Ingiury (AKI) pre-renale?

a. Può comparire nell'arco di poche ore
b. Non è caratterizzato, almeno inizialmente, da alterazioni strutturali a carico del parenchima renale
c. Sul piano fisiopatologico è caratterizzato da una ridotta perfusione renale
d. Può essere causato da sostanze tossiche esogene (per es. antibiotici aminoglicosidici) o endogene (per es. mioglobina)
e. È potenzialmente reversibile

31. La ragade anale può essere la prima manifestazione di quale delle seguenti patologie?

a. Morbo celiaco
b. Colite ischemica
c. Morbo di Crohn
d. Linfoma intestinale
e. Cancro gastrico

32. L'assunzione importante e prolungata di liquirizia può essere causa di:

a. Ipopotassiemia
b. Ittero
c. Ematuria
d. Epilessia
e. Ipercolesterolemia

33. La sindrome da carcinoide presenta:

a. Aumentata escrezione di acido fenilpiruvico
b. Aumentata escrezione di acido vanil-mandelico
c. Aumentata escrezione di acido 5-idrossiindolacetico
d. Aumentata escrezione di tutti e tre i metaboliti suindicati
e. Diminuita escrezione di tutti e tre i metaboliti suindicati

34. L'esposizione a vernici e coloranti è associata con maggiore frequenza a:

a. Cancro della pelle
b. Cancro della vescica
c. Cancro del polmone
d. Cancro della laringe
e. Cancro del fegato

35. L'insufficienza renale acuta da necrosi della papilla renale si verifica con maggiore frequenza:

a. Nell'ipertiroidismo
b. Nella tubercolosi renale
c. Nel morbo di Addison
d. Nel diabete mellito
e. Nella malattia di Cushing

36. Nel follow-up del paziente diabetico quale dei seguenti esami strumentali non trova indicazione ai fini della prevenzione delle complicanze?

a. Ecocardiogramma
b. Monitoraggio pressorio delle 24h
c. Test ergometrico
d. ECG
e. EEG

37. Quale dei seguenti vaccini contiene virus vivi e attenuati?

a. Anti-epatite B
b. Anti-tetano
c. Anti-influenza
d. Anti-morbillo
e. Anti-rabbia

38. La cianosi è frequente in tutte le seguenti condizioni tranne una. Quale?

a. Poliglobulia
b. Embolia polmonare estesa
c. Metaemoglobinemia
d. Anemia grave
e. Esposizione prolungata ad alta quota

39. La colorazione gialla della cute, in assenza di colorazione gialla delle sclere, è dovuta a eccesso di:

a. Carotene
b. Melanina
c. Bilirubina
d. Emoglobina ossidata
e. Sulfemoglobina

40. I carcinomi dell'apice polmonare possono determinare la sindrome di Bernard-Horner per:

a. Compressione del nervo vago
b. Parziale ostruzione della carotide omolaterale
c. Impegno della catena del simpatico
d. Ipertrofia del timo
e. Iperostosi

41. La Dengue è:

a. Una malattia virale acuta trasmessa da alcuni tipi di zanzara in zone endemiche
b. Una malattia virale acuta trasmessa da alcuni tipi di mosca in zone endemiche
c. Una malattia virale acuta trasmessa dalle zecche in zone endemiche
d. Una malattia virale gastrointestinale trasmessa per via oro-fecale in zone endemiche
e. Una malattia protozoaria trasmessa dalle zecche in zone endemiche

42. Cosa caratterizza la malattia di von Willebrand?

a. Cianosi
b. Tempo di emorragia accorciato
c. Deficit funzionale delle piastrine
d. Iperfibrinogenemia
e. Aumento del fattore VIII della coagulazione

43. In un paziente con decadimento cognitivo, alla comparsa di allucinazioni uditive e visive, quale categoria di farmaci risulta indicata in prima istanza?

a. SSRI
b. SSRI-SRNI
c. Benzodiazepine
d. Antipsicotici di nuova generazione
e. Antipsicotici di vecchia generazione

44. La malattia policistica renale autosomica dominante (ADPKD) è causata, in gran parte dei casi, da mutazioni che interessano il gene:

a. PKD1
b. PKD2
c. VHL
d. NPHP1
e. TSC1

45. La natriemia di solito è normale nella:

a. Disidratazione ipertonica
b. Disidratazione ipotonica
c. Disidratazione isotonica
d. Iperidratazione ipertonica
e. Iperidratazione ipotonica

46. La pancreatite acuta tende ad insorgere con maggior frequenza in soggetti:

a. Al di sotto dei 45 anni
b. Al di sotto dei 30 anni
c. Con intolleranza al lattosio
d. Con colelitiasi
e. Affetti da morbo di Crohn

47. Nella Malattia di Graves-Basedow sono generalmente presenti le seguenti alterazioni degli esami di laboratorio, tranne una. Quale?

a. TSH diminuito
b. FT4 e FT3 aumentati
c. VES aumentata
d. Anticorpi anti-TPO presenti
e. Anticorpi anti recettore TSH presenti

48. L'anemia sideropenica ha le seguenti caratteristiche:

a. Microcitica, ipocromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia ridotta
b. Microcitica, ipercromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia ridotta
c. Microcitica, ipocromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia aumentata
d. Macrocitica, ipercromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia ridotta
e. Microcitica, ipocromica, saturazione transferrinica aumentata e ferritinemia ridotta

49. L'iperparatiroidismo può favorire l'insorgenza di:

a. Pielonefrite
b. Ipertiroidismo
c. Ipocalcemia
d. Calcolosi renale
e. Cirrosi epatica

50. Quale tra le seguenti è la manifestazione più frequente della neoplasia dell'apparato urinario?

a. Macroematuria
b. Stranguria
c. Pollachiuria
d. Proteinuria
e. Disuria

51. A quale fra questi gruppi di virus appartiene quello di Epstein- Barr?

a. Papovavirus
b. Adenovirus
c. Herpes virus
d. Parvovirus
e. Picornavirus

52. Una donna di 77 anni, che presenta in anamnesi ipertensione arteriosa e dislipidemia, che punteggio avrà nel calcolo del CHA2DS2-VASc?

a. 2
b. 4
c. 3
d. 5
e. 1

53. Quale tra le seguenti variabili cliniche e laboratoristiche non fa parte del Child-Turcotte-Pugh score (CTP score) per la valutazione prognostica del paziente con cirrosi?

a. Sodiemia
b. Attività protrombinica o INR
c. Presenza e quantità di ascite
d. Presenza e grado di encefalopatia
e. Albuminemia

54. Nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica l'utilizzo di quali farmaci può ridurre la progressione della malattia?

a. ACE-inibitori/sartani
b. ß-bloccanti
c. Diuretici risparmiatori di potassio
d. Cortisonici a basse dosi
e. Antibiotici

55. Nel digiuno protratto si rileva:

a. Chetonemia
b. Iperprotidemia
c. Iperbicarbonatemia
d. Ipervolemia
e. Tendenza all'alcalosi

56. In quale tra le seguenti patologie non è indicato l'eco doppler dei vasi epiaortici?

a. Claudicatio intermittens
b. Pregressa tromboendoarteriectomia carotidea (TEA)
c. Diabete mellito di tipo 2
d. Severa dislipidemia
e. Ipotiroidismo in tiroidite di Hashimoto

57. Nel trattamento del tromboembolismo venoso, dei 4 anticoagulanti orali diretti due possono essere utilizzati senza un pretrattamento con eparina a basso peso molecolare (EBPM). Quali?

a. Dabigatran e rivaroxaban
b. Dabigatran ed apixaban
c. Rivaroxaban ed apixaban
d. Rivaroxaban ed edoxaban
e. Edoxaban e dabigatran

58. Nell'epatite fulminante possono essere presenti le seguenti manifestazioni cliniche tranne una. Quale?

a. Insufficienza renale
b. Diminuita sintesi del fattore V
c. Edema polmonare
d. Ipoglicemia
e. Ittero ingravescente

59. Nell'iter diagnostico della sindrome di Cushing centrale, la somministrazione di desametasone ad alto dosaggio determina:

a. Aumento dei valori di ACTH
b. Aumento dei valori di cortisolemia
c. Aumento di ACTH e cortisolemia
d. Diminuzione dei livelli di cortisolemia
e. Aumento di ACTH e diminuzione della cortisolemia

60. Quale tra le seguenti condizioni non è tra le cause di iperpotassiemia?

a. Scompenso diabetico con iperglicemia e iperosmolarità
b. Uso di ß-bloccanti
c. Acidosi metabolica
d. Uso di diuretici dell'ansa o di diuretici tiazidici
e. Insufficienza renale acuta in fase oligurica

61. Nella cirrosi epatica non colestatica non si osserva di solito:

a. Eritema palmare
b. Ginecomastia
c. Ipoprotrombinemia
d. Spider naevi
e. Ipercolesterolemia

62. In corso di crisi tireotossica può essere presente:

a. Bradicardia
b. Stipsi
c. Intolleranza al freddo
d. Ipertermia
e. Anidrosi

63. Quale ß-bloccante si utilizza abitualmente nel controllo dell'iperattivazione simpatica in corso d'ipertiroidismo?

a. Bisoprololo
b. Carvedilolo
c. Propranololo
d. Metoprololo
e. Atenololo

64. Le manifestazioni cliniche di un ipercortisolismo possono comprendere:

a. Anemia, ipotensione arteriosa, ipercheratosi
b. Iperpotassiemia, ipoglicemie, ipertensione arteriosa
c. Alopecia, ipereosinofilia, ipomagnesemia
d. Ipertensione arteriosa, insulino-resistenza, osteoporosi
e. Linfocitosi, piastrinopenia, atrofia cutanea

65. In un paziente con ipopotassiemia, quale alterazione elettrocardiografica è possibile riscontrare?

- **a.** Onda U prominente
- **b.** Onda T appuntita
- **c.** Onda T a tenda
- **d.** Onda Delta
- **e.** Tratto ST sopraslivellato

66. La più frequente neoplasia gastrica causata da Helicobacter pylori è:

- **a.** Tumore gastrointestinale stromale
- **b.** Carcinoide
- **c.** Linfoma a cellule T
- **d.** MALToma
- **e.** Adenocarcinoma

67. Qual è la sindrome caratterizzata da difettosa coniugazione della bilirubina?

- **a.** Dubin-Johnson
- **b.** Mallory-Weiss
- **c.** Gilbert
- **d.** Israel
- **e.** Peutz-Jeghers

68. Quale affermazione è vera sulla copertura vaccinale?

- **a.** È la quota di soggetti vaccinati sul totale della popolazione e ha una soglia di sicurezza del 95%
- **b.** È la quota di soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione e ha una soglia di sicurezza del 95%
- **c.** È la quota di soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione e ha una soglia di sicurezza del 90%
- **d.** È la quota di soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione e ha una soglia di sicurezza dell'85%
- **e.** È la quota di soggetti vaccinati sul totale della popolazione e ha una soglia di sicurezza dell'85%

69. Quale dei seguenti antipertensivi può provocare iperpotassiemia?

a. α-metildopa
b. Calcio antagonisti
c. ACE-inibitori
d. Diuretici tiazidici
e. α-bloccanti

70. A quale gruppo di sostanze chimiche appartiene la penicillina?

a. Glicidi
b. Glicoproteine
c. Lipoproteine
d. ß-lattamici
e. Polisaccaridi

71. Il Linezolid è indicato soprattutto per il trattamento di:

a. Infezioni da germi Gram positivi, incluso Stafilococco aureo meticillino-resistente
b. Infezioni da miceti
c. Infezioni da germi Gram positivi, escluso Stafilococco aureo meticillino-resistente
d. Infezioni da germi Gram negativi, incluso Pseudomonas aeruginosa
e. Infezioni da germi Gram negativi, escluso Pseudomonas aeruginosa

72. L'ipotiroidismo primitivo riconosce tra le cause più frequenti:

a. Tiroidite di Hashimoto
b. Pregressi interventi sull'ipofisi
c. Sindrome della sella vuota
d. Danno vascolare ipofisario post-partum
e. Neoplasie della tiroide

73. Quale delle seguenti positività anticorpali è la meno rilevante per la diagnosi di epatite autoimmune?

a. Positività degli anticorpi anti-actina
b. Positività di ANA
c. Positività di ANA e di SMA
d. Positività degli anticorpi anti-LKM
e. Positività degli anticorpi anti-SLA

74. Quale di queste affermazioni relative alla mielofibrosi è errata?

a. È una malattia rara
b. È un disordine mieloproliferativo
c. Può essere l'evoluzione della policitemia vera
d. È la complicanza più frequente del linfoma non Hodgkin
e. Frequentemente è presente la mutazione Jak 2

75. Quale è il valore soglia di HbA1c per porre diagnosi di diabete mellito?

a. >8.0%
b. >8.5%
c. >6.0%
d. >6.5%
e. >7.0%

76. Quale dei seguenti farmaci induce con maggiore frequenza un danno miocardico?

a. Vincristina
b. Metotrexate
c. 5-Fluorouracile
d. Tamoxifene
e. Adriamicina

77. Quale malattia non si accompagna solitamente ad inappetenza?

a. Tubercolosi
b. Insufficienza renale cronica avanzata
c. Adenoma dell'apparato insulare del pancreas
d. Morbo di Addison
e. Carcinoma del pancreas

78. Nella scelta di una terapia ipnoinducente, in particolare in un paziente attivo, sono da preferire le benzodiazepine ad emivita breve/intermedia. Quale molecola non rientra in questo gruppo?

a. Alprazolam
b. Triazolam
c. Lormetazepam
d. Diazepam
e. Lorazepam

79. La composizione più frequente dei calcoli delle vie urinarie è rappresentata da:

a. Ossalato di calcio
b. Fosfato di calcio
c. Bilirubinato di calcio
d. Fosfato ammonio magnesiaco
e. Acido urico

80. Quale tra i seguenti diuretici non useresti nel trattamento dell'ascite in corso di cirrosi?

a. Spironolattone
b. Canrenone
c. Furosemide
d. Torasemide
e. Metolazone

81. Quale tra le seguenti affermazioni relative alla colica biliare non è esatta?

a. Il dolore insorge spesso un'ora dopo un pasto abbondante o ricco di grassi
b. Il dolore è riferito all'ipocondrio destro o all'epigastrio
c. Il dolore si può irradiare posteriormente o alla spalla
d. Il dolore dura almeno 15-30 minuti
e. Il dolore non è generalmente ben controllabile con gli analgesici

82. Quale tra le seguenti affermazioni relative alla sclerosi multipla non è esatta?

a. Esordisce generalmente in giovane età
b. Il sesso femminile è più colpito del sesso maschile
c. È una malattia autoimmune cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale e del midollo
d. Esordisce spesso con disturbi del visus
e. Porta sempre alla disabilità fisica e intellettiva

83. Quale tra le seguenti affermazioni sul tremore essenziale è errata?

a. Non ha eziologia nota
b. Fattori predisponenti possono essere genetici e/o ambientali
c. Si manifesta prevalentemente agli arti superiori
d. Si aggrava in condizioni di stress
e. Non si associa mai a decadimento cognitivo e/o parkinsonismo

84. L'anemia da carenza di acido folico presenta le seguenti caratteristiche:

a. Macrocitica, ipercromica
b. Macrocitica, ipocromica
c. Microcitica, ipercromica
d. Microcitica, ipocromica
e. Normocitica, normocromica

85. Il quadro laboratoristico di un iperparatiroidismo primitivo si caratterizza per:

a. Ipocalcemia, Iperfosforemia, PTH normale
b. Ipercalcemia, Iperfosforemia, PTH aumentato
c. Ipercalcemia, Ipofosforemia, PTH aumentato
d. Ipocalcemia, Ipofosforemia, PTH aumentato
e. Ipocalcemia, Ipofosforemia, PTH diminuito

86. In quale delle seguenti condizioni è meno probabile l'insorgenza della fibrillazione atriale?

a. Ipertensione arteriosa
b. Cardiopatia ischemica
c. Valvulopatie e/o cardiomiopatie
d. Ipotiroidismo
e. Età avanzata

87. Nella celiachia una di queste affermazioni è falsa. Quale?

a. È una sindrome da malassorbimento con varie espressioni fenotipiche
b. È un'intolleranza alimentare frequente
c. Non si associa a malattie autoimmmuni
d. La presenza di anticorpi anti transglutaminasi può fare ipotizzare la diagnosi
e. La biopsia duodenale permette di confermare la diagnosi

88. La sindrome da demielinizzazione osmotica è una condizione grave e spesso irreversibile, che può insorgere a seguito di:

a. Correzione rapida o eccessiva dell'ipernatriemia
b. Correzione rapida o eccessiva dell'iponatriemia
c. Correzione rapida o eccessiva dell'ipokaliemia
d. Correzione non adeguata dell'iperkaliemia
e. Correzione lenta e non adeguata dell'acidosi metabolica

89. Quale tra le seguenti indagini eviteresti in un paziente con un quadro di epatite acuta?

a. Anticorpi anti-HAV IgM
b. HBsAg
c. HEV-RNA
d. Anticorpi anti-transglutaminasi
e. Anticorpi anti-nucleo

90. Quale tra le seguenti indagini non è utile per l'inquadramento diagnostico nel sospetto di una pancreatite acuta?

a. Amilasemia pancreatica e lipasemia
b. Trigliceridemia
c. Colesterolemia
d. Calcemia
e. Ecografia dell'addome superiore

91. Quale tra le seguenti manifestazioni clinico/laboratoristiche non compete al quadro della "sindrome uremica"?

a. Pericardite/versamento pericardico
b. Alterazioni dello stato di coscienza fino al coma
c. Emorragie digestive
d. Anemia
e. Ipertransaminasemia

92. Quale tra le seguenti neoplasie pancreatiche ha la prognosi peggiore?

a. Cistoadenoma mucinoso
b. Cistoadenocarcinoma mucinoso
c. Adenocarcinoma duttale
d. Insulinoma maligno
e. Tumore neuroendocrino maligno non secernente

93. Le seguenti condizioni possono determinare un aumento del NT-pro BNP, ad eccezione di una. Quale?

a. Embolia polmonare
b. Scompenso cardiaco
c. Età avanzata
d. Obesità
e. Cirrosi epatica

94. Quale tra le sotto indicate neoplasie presenta maggiore incidenza in età giovanile?

a. Carcinoma dello stomaco
b. Sarcoma di Ewing
c. Carcinoma della prostata
d. Leucemia linfatica cronica
e. Plasmocitoma

95. Quale tra questi farmaci può essere impiegato nel trattamento dell'iperuricemia?

a. Vildagliptin
b. Febuxostat
c. Ramipril
d. Clopidogrel
e. Liraglutide

96. Tutte le seguenti patologie possono determinare osteoporosi nella donna, tranne una. Quale?

a. Menopausa precoce spontanea
b. Amenorrea secondaria
c. Policistosi ovarica
d. Menopausa chirurgica con annessiectomia
e. Distiroidismi

97. L'acidosi respiratoria è caratterizzata da:

a. Aumento dell'acido lattico e riduzione dei bicarbonati
b. Aumento della pCO2 e riduzione del pH
c. Riduzione della pCO2 e riduzione del pH
d. Aumento della pCO2 e aumento del pH
e. Aumento della pCO2 e riduzione dei bicarbonati

98. L'effetto collaterale più grave dei tiouracili, utilizzati nell'ipertiroidismo, è:

a. Policitemia
b. Agranulocitosi
c. Piastrinopenia
d. Incremento degli enzimi epatici
e. Incremento degli enzimi muscolari

99. Tutti i seguenti farmaci sono inibitori selettivi del re-uptake della serotonina (SSRI) tranne uno. Quale?

a. Paroxetina
b. Fluoxetina
c. Amitriptilina
d. Sertralina
e. Escitalopram

100. Nella sindrome del tunnel carpale, il paziente lamenta, in genere, dolore associato a parestesie:

a. Delle prime quattro dita della mano
b. Delle ultime due dita della mano
c. Delle ultime quattro dita della mano
d. Delle ultime tre dita della mano
e. Del palmo della mano ma non delle dita

VERSIONE B

N. domanda	Risposta
1	B
2	D
3	E
4	B
5	D
6	D
7	E
8	D
9	B
10	B
11	D
12	D
13	B
14	B
15	D
16	D
17	C
18	A
19	C
20	A
21	E
22	C
23	E
24	A
25	C
26	D
27	D
28	B
29	B
30	D
31	C
32	A
33	C
34	B

N. domanda	Risposta
35	D
36	E
37	D
38	D
39	A
40	C
41	A
42	C
43	D
44	A
45	C
46	D
47	C
48	A
49	D
50	A
51	C
52	B
53	A
54	A
55	A
56	E
57	C
58	C
59	D
60	D
61	E
62	D
63	C
64	D
65	A
66	E
67	C
68	B

N. domanda	Risposta
69	C
70	D
71	A
72	A
73	A
74	D
75	D
76	E
77	C
78	D
79	A
80	E
81	E
82	E
83	E
84	A
85	C
86	D
87	C
88	B
89	D
90	C
91	E
92	C
93	D
94	B
95	B
96	C
97	B
98	B
99	C
100	A

ESEMPIO:

1. L'uso dell'anfetamina nella terapia dell'obesità può produrre tutti i seguenti effetti collaterali, eccetto uno. Quale?

a tachicardia
b insonnia
c secchezza delle feci
d aumento della tensione endoculare
e diarrea

Per indicare la risposta esatta al quesito numero **1**, in questo caso quella corrispondente alla lettera "**e**", è necessario indicare nel modo seguente sul modulo risposta:



Solo all'ordine del Presidente della Commissione, il candidato aprirà il presente involucro.

Il candidato dovrà compilare a carattere stampatello maiuscolo il **modulo anagrafico** in ogni sua parte secondo le indicazioni in esso riportate, **senza separarlo** dal modulo delle risposte.
Il candidato inizierà quindi a rispondere alle domande del questionario secondo le indicazioni precedentemente illustrate.

Dal momento in cui il Presidente della Commissione dà l'ordine di apertura degli involucri, i candidati hanno a disposizione **due ore** per lo svolgimento della prova.

Al termine della prova il candidato dovrà:
- separare il modulo anagrafico dal modello delle risposte e, unitamente al questionario, dovrà inserirlo nella busta piccola, che dovrà essere chiusa e incollata;
- inserire la suddetta busta unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla e incollarla.

Durante la prova dovrà essere posto in modo evidente sul tavolo il documento di riconoscimento.

Roma 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.